

# IETEIKUMI ŠĶIRNES AUDZĒŠANAI

## Ābele 'Bohemia'

### ŠĶIRNES ĪPATNĪBAS:

#### Ziemas šķirne.

**Koks** vidēja auguma, vainags rets, izplests, ražo uz rīkšzariem un reti izvietotiem rievaiņiem, zaru pamatnes atkailinās. Ražot sāk vidēji ātri, ar pareizu vainaga veidošanu pietiekami ražīga. Tieksme ražot ik gadus.

**Augļu** kvalitāte izcila. Tie vidēji lieli vai lieli, ieapaļi koniski, gludi, ļoti izlīdzināti, izskatīgi. Pamatkrāsa dzeltena, virskrāsa koši tumšsarkana, sedz lielāko daļu augļa. Mīkstums vidēji stingrs, saldskābs, aromātisks, vienmēr ar teicamu garšu. Augļi transportā izturīgi, kokā noturīgi līdz vākšanas gatavībai. Vācami no septembra 2. puses, dzesētavā glabājas līdz februārim, martam vai ilgāk; glabāšanas beigās izplatās puves.

**Slimībizturība:** samērā laba izturība pret kraupi, kaut gan bez augu aizsardzības līdzekļu lietošanas neliels kraupis būs; bojā augļu puves un vēzis.

**Ziemcietība** viduvēja, tomēr labās dārzu vietās pārziemo visā Latvijas teritorijā. Vecākiem kokiem ziemcietība pazeminās. Sliktākās dārzu vietās obligāti potējama vainagā. Ieteicams potēt vainagā arī labās dārzu vietās, jo tad būs ātrāks ražošanas sākums un stabilāka ikgadējā ražība.

### REKOMENDĀCIJAS:

**Piemēroti potcelmi:** B.9, B.396, Pure1, MM 106

**Stādīšanas attālumi.** Uz maza auguma potcelmiem 1,5 m starp kokiem, uz vidēja auguma potcelmiem 2,5 – 3,0 m starp kokiem, uz sēklaudžu potcelmiem 4 × 6 m.

**Veidošanas sistēmas.** Tikai ar detalizētu veidošanu iespējams panākt, lai šķirne labi zarotos un attiecīgi dotu labas ražas. Rīkšzaru ražošanas tipam dzinumam pamatnes stipri atkailinās, bet katra rīkšzara galā abpus auglim veidojas divi jaunie dzinumi. Lai veicinātu zarošanos, viens no tiem agri pavasarī jāsaīsina. Šāda veidošana uz potcelma Pure 1 deva labus rezultātus, bet ir darbietilpīga. Uz maza auguma potcelma koki veidojami pēc slaidās vārpstas principiem, uz vidēja auguma potcelma ieteicams veidot plakanu vai piramidālu vainagu. Jebkurā gadījumā jāpaplašina skeletzaru atiešanas leņķi.

**Agrotehnika.** Šķirnei jānodrošina labi augšanas apstākļi, lai paaugstinātu ziemcietību. Jāierobežo pārlicka slāpekļa mēslojuma lietošana, jo tas veicinās garu pieaugumu veidošanos, vainags kļūs ļoti rets, un ražas pieaug lēni.

**Ražas normēšana:** šķirnei vairums augļu veidojas pušķos dzinumam galos, kas iespiesti starp diviem jaunajiem pieaugumiem. Pušķī jāatstāj ne vairāk kā divi āboli. Pretējā gadījumā vākt augļus ir grūti, un bieži tiem iztrūkst kātiņš.

**Augu aizsardzība.** Šķirnei ir laba izturība pret kraupi, tomēr vēlami augu aizsardzības līdzekļu smidzinājumi atbilstoši integrētās audzēšanas prasībām. Lietainās sezonās neilgi pirms vākšanas gatavības augļiem kāta bedrē var sākties mizas mikroplaisāšana, glabāšanas laikā tas pastiprina puvi bojājumus. Šādās sezonās dārzā nepieciešami vēlīnie fungicīdu miglojumi. Stumbra miza un zaru pamatnes jāsaģē no ziemas bojājumiem, tos kalķojot; sala brūcēs bieži iemetas vēzis. Potējumi vainagā pārziemo daudz labāk, vēzis bojā reti, tad var nekalķot.

**Vākšanas laiks.** Vācami septembra beigās vai oktobra sākumā, kad joda-cietes tests ir ne vairāk kā 4 - 5 balles (9 ballu skalā). Nokavējot vākšanu, augļu miza plaisā (īpaši pie kātiņa), un glabāšanas laikā attīstās puve.

**Glabāšana, realizācijas laiks.** Realizācijas gatavība: sākot no novembra līdz februārim, martam. Labu garšu un mīkstuma kvalitāti saglabā līdz glabāšanas beigām, bet cieši jāseko puves attīstībai.

**Šķirne ieteicama** komerciālai audzēšanai tikai prasmīgiem dārzkopjiem labākajās dārzu vietās. Piemērota realizācijai kā "ekstra klases" auglis.





*Ābele 'Bohemia'*