

# IETEIKUMI ŠĶIRNES AUDZĒŠANAI

## Ābele 'Pure Ametist'

### ŠĶIRNES ĪPATNĪBAS:

#### Ziemas šķirne.

**Koks:** vidēja auguma, stāvi - izplests vainags, viegli veidojams. Ražo gan uz īsajiem augļzariņiem, gan uz rīkšzariem. Šķirne ātrražīga, ražīga, ražo katru gadu. Laba dabiskā fizioloģiskā augļizmetņu retināšanās, neveidojas ražas pārslodzes.

**Augļi:** lieli, ieapaļi nošķelti koniski, izlīdzināti pēc formas un lieluma. Pamatkrāsa dzeltena, virskrāsa intensīvi sarkana saplūdusi, reizēm ar rozā vai oranži-brūnganu toni. Tipiski divkrāsu augļi – aptuveni 1/3 - 1/2 no virsmas ir tīras pamatkrāsas sektors, bet otra puse ir intensīva virskrāsa. Sabiezinātā vainagā var pārāk vāji veidoties virskrāsa, labai visu augļu izgaismošanai, nepieciešama vasaras veidošana. Mīkstums stingrs, kraukšķīgs, sulīgs, krēmkrāsas līdz gaiši iedzeltens. Garša savdabīga, teicama, saldskāba ar salduma pārsvaru un augļu karameļu aromātu. Āboli pašizretinās, vienmēr ir lieli. Augļi transportabli, labi glabājami, ilgi saglabā labu tirgus-preču izskatu, stingru mīkstuma struktūru un teicamu garšu.

**Slimībizturība:** pietiekami augsta izturība dārzā pret kraupi, lai gan imūna nav. Var slimot ar miltrasu, lenticeļu puvēm. Dažās dārzu vietās (piemēram, Pūrē - sausā vietā, kur augsne ir dolomīts ar grants piejaukumu) ir bijusi novērota zemzemes rūgtā korķplankumainība. Mālainākās augsnes (piemēram, Dobelē) šķirne ar korķplankumainību un atvārsnīšu puvēm ne reizes nav slimojusi. Laba izturība pret vēzi. Var bojāt laputis.

**Ziemcietība:** augsta.

### REKOMENDĀCIJAS:

**Piemēroti potcelmi:** MM 106, B.118, B.9, Pure 1

**Stādīšanas attālumi:** Uz vidēja auguma potcelmiem 2,0 - 2,5 m starp kokiem, uz maza auguma potcelmiem 1,5 m starp kokiem.

**Veidošanas sistēmas:** slaidā vārpsta; saplacināts vainags ar pazeminātu galotni. Vecākiem kokiem atjaunojošā griešana.

**Agrotehnika:** Saskaņā ar integrētās audzēšanas sistēmas vadlīnijām. Dārzu vietās, kur novērotas problēmas ar korķplankumainību, jāseko kalcija pietiekamai nodrošināšanai, ja nepieciešams, jāveic papildus miglojumi uz lapām.

**Augu aizsardzība:** Lai arī šķirne ir samērā kraupja izturīga, ir nepieciešami fungicīdu smidzinājumi, lai nepieļautu augļu puvi attīstību. Jāpievērš īpaša uzmanība laputu kontrolei.

**Vākšanas laiks:** Augļu vākšana septembra beigās - oktobra pirmajās divās nedēļās. Ieteicama dalīta vākšana. Jāvāc vidējā līdz diezgan augsta gatavības pakāpē, kad ir labi attīstījusies virskrāsa un sasniegts Brix% vismaz 11, bet Streifa indekss 0,14 - 0,30,  $I_{DA}=0,60 - 0,80$ . Mīkstums šajā laikā joprojām būs stingrs, aptuveni 9 - 10 kg/cm<sup>2</sup>. Vēlāk vākti augļi būs košāki, bet var kokā sākt pārgatavoties un birt.

**Glabāšana, realizācijas laiks.** Normālās atmosfēras dzesētavā 1,5 - 2,0 °C temperatūrā glabājas līdz martam-aprīlim, lietošanas gatavība sākas no novembra. Sākoties lietošanas gatavībai, augļu mīkstums joprojām ir stingrs – 7 - 8 kg/cm<sup>2</sup>. Pietiekami labi saglabā realizācijai pieņemamu stingrību un sulīgumu arī istabas temperatūrā - vidēji 7 - 10 dienas.

**Šķirne ieteicama** komercdārziem, izmantojot integrēto audzēšanas sistēmu, bet bioloģiskiem dārziem – tikai ar rūpīgu kaitēkļu un slimību kontroli un ierobežošanu.



Ābele 'Pure Ametist'