



EIROPAS SAVIENĪBA  
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



EIROPAS REĢIONĀLĀS  
ATTĪSTĪBAS FONDS

2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142



EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:  
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

211211/C-120

# AVEŅU AUDZĒŠANAS , PROBLĒMAS



Latvijas Valsts  
Augļkopības  
institūts

LVAI vadošā pētniece Sarmīte Strautiņa

## **Vietas izvēle**

Ø Stādīšanai nav piemērotas applūstošas vietās, vai ieplakas uz lauka, kurās var ilgāku laiku atrasties stāvošs ūdens, jo šādās vietās var būt diezgan ievērojumi stādu izkritumi, vai arī avenes slikti aug.

Ø Jāizvērtē iespēja ierīkot apūdeņošanu, īpaši vietās, kur vieglās, smilšainas augsnes.

## Stādīšana

*ØLai ekonomiski izmantotu mēslojumu , nodrošinātu augus ar nepieciešamajiem barības elementiem un pasargātu apkārtējo vidi no pārmērīgām mēslojuma devām*

*ØRūpīgi sagatavot lauku pirms stādīšanas*

*ØAtmatā augsnes sagatavošanu sākt jau iepriekšējā gadā pirms stādīšanas vai vismaz no pavasara, ja paredzēts stādīt rudenī*

*ØĪpaša uzmanība daudzgadīgo nezāļu iznīcināšanai*

*ØNodrošināt bagātīgu organisko vielu saturu augsnē vismaz 3%*

*ØLauku stādīšanai sagatavot vismaz mēnesi iepriekš*

**ØRudens avenes stāda tikai pavasarī!**

## **Stādījumu kopšana - lielākā problēma aveņu audzēšanas saimniecībās**

ØBalstu sistēmas neatkarīgi no šķirnes

ØAveņu rinda ne platāka kā 30-35 cm

ØApdobe tīra 50 cm uz katru pusi no rindas vidus

ØApūdeņošana sevišķi laikā no ziedēšanas līdz ražai

ØNoražojošo un lieko dzinumumu izgriešana bez celmiņiem

ØDaudzgadīgo nezāļu iznīcināšana īpaši no pavasara izšķir turpmāko stādījuma pastāvēšanu un ražošanu





















**Šķirnes**

Vasaras avenes  
***'Glen Ample'***

Rudens avenes  
***'Polana'***



**Bojājumi**













## Aveņu dzinumu pangodiņš *Resseliella theobaldi* (Barnes)



Pangodiņa kāpuri bojā dzinumus. Izlido maija vidū. Sākumā pangodiņi dēj olas uz iepriekšējā gada dzinumu galotnēm, bet vēlāk uz jaunajiem dzinumiem, mizas plaisās. Kāpuru bojāšanās vietās izveidojās kambija iespaidumu bedrītes, audi atmirst un mizas virspusē izveidojas tumši zili plankumi. Bojātajās vietās dzinumi var nolūst, vai arī pavājinās ziemcietība un tie aiziet bojā. Ziemā kokonos augsnē pie dzinumu pamatnes.

***Apkaro: profilaktiski jāizmanto tikai vesels stādāmais materiāls, augsni mulčē ar 10-15 cm kūdras, zāgskaidu vai cita materiāla kārtu rudenī vai pavasarī līdz ar to apgrūtinā pangodiņa izlidošanu. Pangodiņa lidošanas laikā smidzina ar deci vai fastaku. Aprīļa beigās izliek dzeltenus līmes vairogus un dzeltenus ūdens ķeramos slazdus***















18 07 2013