

Pumpurērces (*Cecidophyopsis*) upenēm un jāņogām

Arturs Stalažs

LVAI Augu pataloģijas un entomoloģijas nodaļa

10.07.2014.

Bojājumi



Attēls: http://www.aphotofauna.com/mite_gall_cecidophyopsis_ribis_blackcurrant_big_bud.html


Sugas un saimniekaugi

*Kopumā ir zināmas **5** pumpurērcu sugas, kas bojā jāņogu ģints augus*

*Latvijā **3** vai **4** pumpurērcu sugas*

*Saimnieciski nozīmīgas varētu būt tikai **3** sugas, kas bojā kultivētās šķirnes*

Izplatība



Pumpurērcu ierobežošana

Pasaulē nav zināmi augi, kas būtu rezistenti pret visām pumpurērcu sugām, tādēļ tirdzniecībā “rezistentās” šķirnes ne vienmēr ir atbilst faktam


Profilaktiskie pasākumi

- Kvalitatīvs stādāmais materiāls*
- Ērcu pārnēsēju ierobežošana*
- Šķirņu izvēle atbilstoši reģionam*

*‘Katyuša’
‘Mara Eglite’*

Izplatība

'Katyuša'
'Mara Eglite'



Pumpurērcu ierobežošana

Ierobežošana ražojošajos stādījumos

- *Invadēto zaru laicīga izgriešana (ziemā)*
- *Ērcu pārnēsēju ierobežošana*
- *Krūmu audzēšanas laika samazināšana*

'Katyuša'
'Mara Eglite'

Ērcu invāzijas perēkļu ierobežošana

- *Iznīcina lauka tuvumā esošus vecus un neizmantotus stādījumus*



EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

211211/C-120

Paldies par uzmanību