

IETEIKUMI ŠĶIRNES AUDZĒŠANAI

Ābele 'Daina'

ŠĶIRNES ĪPATNĪBAS:

Agra ziemas - ziemas šķirne.

Koks: vidēja līdz spēcīga auguma, ļoti atkarīgs no potcelma. Vainags izplests. Ražošanas tips jauktais - gan uz rīkšzariem, gan rievainiem. Ražot sāk agri, ražība augsta, bet ir novērota tendence ražot izteikti periodiski. Vāji izteikta fizioloģiskā augļizmetņu nobiršana, tieksme ražot daudzus sīkus augļus ķekaros pa 4 - 5. Tas nav pieļaujams, nepieciešama augļizmetņu retināšana.

Augļi: vidēji lieli līdz pasīki, apaļi, viegli saplacināti, ļoti vāji ribaini. Viscaur klāti ar intensīvu, tumši purpursarkanu virskrāsu un gaišu apsarmi - līdzīgu kā uz plūmēm. Augļi skaisti, glezni, deserta kvalitātes. Mīkstums smalkgraudains, krēmbalts, vidēji sulīgs, vidēji stingrs. Garša saldskāba ar salduma pārsvaru, teicama, ar šķirnei 'Lawfam' līdzīgu aromātu. Sīkiem, nepietiekami normētas ražas, augļiem garša nepilnvērtīga, tad trūkst salduma.

Slimībizturība: vidēji izturīga pret kraupi, vēzi, miltrasu. Augļi samērā izturīgi pret augļu puvēm.

Ziemcietība vidēja.

REKOMENDĀCIJAS:

Piemēroti potcelmi: MM 106, B.9, B.396.

Stādīšanas attālumi. Uz vidēja auguma potcelmiem 2,5 -3,0 m starp kokiem, uz maza auguma potcelmiem 1,5 -2,0 m.

Veidošanas sistēmas: slaidā vārpsta; plakanais vainags. Periodiska augļzariņu atjaunināšana īsinot. Plati atzarošanās leņķi šķirnei pārsvarā veidojas dabiski.

Agrotehnika. Kopšana pēc pašreizējām integrētās audzēšanas sistēmas vadlīnijām.

Augu aizsardzība. Bioloģiskajiem dārzeņiem šī šķirne ir maz piemērota kraupja ieņēmības dēļ. Piemājas dārzos jauktajos stādījumos iztur arī bez fungicīdu izmantošanas. Lielākās platībās audzējama tikai ar integrētās audzēšanas sistēmā atļautajiem fungicīdu smidzinājumiem.

Vākšanas laiks. Augļu vākšanu nedrīkst nokavēt. Tuvojoties vākšanas gatavības fāzei, vējainā laikā viegli birst. Ieteicams vākt divos paņēmienos - vispirms vislabāk krāsotos un lielākos, bet pārējos augļus apmēram pēc divām nedēļām. Pirmā vākšana jāsāk tūlīt pēc šķirnes 'Auksis' novākšanas, negaidot to biršanu. Streifa indekss vākšanas gatavībā 0,18 - 0,35, $I_{DA}=1,480$, parasti vācami septembra pēdējā nedēļā - oktobra sākumā.

Glabāšana, realizācijas laiks. Parastā dzesētavā glabājot, lietojami aptuveni 2 mēnešus pēc novākšanas, realizējami līdz janvārim - februārim. Vēlu vāktie ir košāk krāsoti, bet glabājas slikti, realizējami uzreiz. Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums normālas atmosfēras glabātavās - līdz februāra sākumam, tad augļi ir garšīgāki un aromātiskāki. ULO tipa režīmos glabājas ilgāk - līdz aprīlim - martam, bet mizas krāsa var palikt pelēcīgāka, tumšāka, nepievilcīgāka. Realizācijas gatavībā novembrī - janvārī, $I_{DA}=1,3 - 1,4$, stingrība 6,0 - 6,6, Brix% 12 - 14.

Šķirne ieteicama galvenokārt piemājas dārzeņiem. Komercdārzos augļi pēc lieluma pārsvarā atbilst skolas augļu kategorijai. Augļi izmantojami kā uz kodu āboli, realizācijai pa vienam vai nelielos iepakojumos, kas izmantojams autobraucējiem, ceļotājiem, skolas bērnu pusdienu pakās.



Ābele 'Daina'